

Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "MEDIO FRIULI"

Dipartimento di Prevenzione

via Chiusaforte 2 – Udine

☎0432 553211- 553262 ☎0432 553500-553255

e-mail: malattie.infettive@ass4.sanita.fvg.it

LA PEDICULOSI

Informazioni utili ai genitori

I pidocchi sono parassiti di piccolissime dimensioni (2-3 mm) e di colore grigio, che possono localizzarsi tra i capelli, soprattutto nelle zone circostanti la nuca e le orecchie; si nutrono di sangue pungendo il capo più volte al giorno e causando in questo modo il prurito. Sul cuoio capelluto il pidocchio può vivere per parecchie settimane e la femmina può deporvi fino a 300 uova, *lendini*, di colore biancastro e facilmente confondibili con la forfora, dalle quali escono le larve che completano il loro sviluppo in 7 giorni.

La prevenzione ed il controllo della pediculosi richiedono il coinvolgimento e la cooperazione delle famiglie.

Il problema è facilmente risolvibile seguendo scrupolosamente le indicazioni di trattamento che seguono, anche se bisogna dire che nessun prodotto ha effetto preventivo, per cui non si può escludere una successiva reinfestazione.

A tale proposito si sottolinea che i prodotti contro la pediculosi vanno utilizzati per il trattamento dell'infestazione da pidocchi e non per prevenirla.



IL SINTOMO PIU' EVIDENTE E' IL PRURITO CHE INDUCE IL BAMBINO A GRATTARSI IN CONTINUAZIONE IL CAPO.

Il contagio avviene prevalentemente →

Il pidocchio non vola e non salta, ma poiché è capace di muoversi per brevi tratti, il contagio può avvenire anche →

- **CONTATTO DIRETTO CON INDIVIDUI INFESTATI**
- indirettamente tramite berretti sciarpe pettini, spazzole ecc..



Come notare la loro presenza

Per rilevare l'infestazione (la prima cosa che si nota è la presenza delle uova, mentre i pidocchi adulti sono difficili da individuare) è necessario **ispezionare accuratamente la testa** dedicando attenzione alle zone dietro le orecchie e alla nuca. Meglio se con una lente di ingrandimento e in un ambiente intensamente illuminato.

Trattare subito l'infestazione usando sui capelli un **prodotto specifico** acquistabile in farmacia. Risciacquare con aceto (100 gr. in un litro di acqua calda). Dopo il trattamento con acqua e aceto tiepidi, ispezionare nuovamente il capo e **staccare manualmente con pazienza tutte le uova** rimaste, servendosi anche di un pettine fitto, pettinando ciocca per ciocca, partendo dalla radice dei capelli.



Ripetere il trattamento dopo 7 giorni

La **permetrina** e le **piretrine (NIX, MILICE)** risultano i prodotti di prima scelta per la loro efficace e sicurezza.

Il **malathion (AFTIR GEL)** è anch'esso efficace ma deve essere riservato solo ai casi di documentata resistenza alle piretrine o alla permetrina.

Non esistono sostanze "repellenti" efficaci

Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario.

Lavare a 60°C i vestiti (soprattutto berretti), le lenzuola e le federe

Effettuare un controllo sistematico a tutti i familiari e alla scoperta di uova, applicare in modo scrupoloso le regole descritte per il trattamento dell'infestazione da pidocchi.

RIAMMISSIONE A SCUOLA

La riammissione a scuola è possibile solo dopo adeguato trattamento e con autocertificazione dei genitori che è stato effettuato il trattamento. In caso di ripetute infestazioni la riammissione sarà possibile con certificato del Dipartimento di Prevenzione

Per ulteriori informazioni

UDINE	tel. 0432 553211/ 62
CIVIDALE	tel. 0432 708601
CODROIPO	tel. 0432 909180
SAN DANIELE	tel. 0432 949561/ 81
TARCENTO	tel. 0432 780206/ 05

La disinfestazione dei locali della scuola non è necessaria ed è pertanto sufficiente la pulizia ordinaria, poichè i pidocchi del cuoio capelluto sopravvivono solo per breve tempo all'ambiente esterno.

